

## 云南舞花姜属一新种

钱义咏

(云南省思茅行署林业局, 云南 思茅 665000)

### A NEW SPECIES OF *GLOBBA* FROM YUNNAN

QIAN Yi-yong

(Forestry Bureau of Simao Administrative Office, Simao 665000, China)

关键词: 舞花姜属; 孟连舞花姜; 新种

Key words: *Globba*; *Globba menglianensis*; New species

中图分类号: Q949.718.33 文献标识码: A 文章编号: 1005–3395(2001)02–0109–02

孟连舞花姜 新种 图 1

*Globba menglianensis* Y. Y. Qian sp. nov. Fig. 1

*G. heteroacarpa* Y. Y. Qian, ined.

Species affinis *G. racemosae* Smith, sed foliorum laminis lanceolatis, 9–30 cm longis, 1–6 cm latis, utrinque pubescentibus, paniculis 25–50 cm longis, calycis tubis 8–10 mm longis, corollae tubis 1.8–2.2 cm longis, dense pubescentibus, corollae lobis 8.5–9.5 mm longis, staminodiis lateralibus ovatis, 8–9 mm longis, labellis obovatis 14–18 mm longis, basi auriculatis, filamentis 2–2.5 cm longis, antheris 4.5–5.5 mm longis, inflorescentiis fructiferis superne bulbilis differt.

Herba perennis 0.6–1.5 mm alta; caulis basi crassiusculus. Laminae lanceolatae, 9–30 cm longae, 1–6 cm latae, apice caudatae, basi cuneatae, utrinque pubescentes, sessiles; vaginae extra secus costas et margine pubescentes; ligulae papyraceae, 1–2 mm longae, ciliatae. Paniculae terminalis, 25–50 cm longae; bracteae caducae, lanceolatae, 13–15 mm longae; bracteolae sub cymbiformes, c. 2 mm longae; calycis tubi infundibuliformes, vilidifusci vel fusci, luteolo-glandulosi, 8–10 mm longi, apice 3-dentibus; corollae tubi 1.8–2.2 cm longi, dense pubescentes, lobis ovatis, refractis, luteo-fuscis, glandulosis, 8.5–9.5 mm longis; staminodia lateralia ovata, eburnea, glandulosa, 8–9 mm longa, apice retusa; labella obovata eburnea vel luteola, glandulosa, 14–18 mm longa, apice 2-lobata, basi lutea, 2-purpureo-nervis, auriculata, breviter calcarata, prope filamenti basin inserta; filamenta 2–2.5 cm longa; antherae 4.5–5.5 mm longae, lateralibus non alatae, connectivis apice appendiculatis. Inflorescentia fructifera superne flower, bulbilis, 3.5–6.5 mm longis, 1.5–3.5 mm latis, inferne capsula elliptica, 1–2 cm longa, 1–1.3 cm lata, seminibus ovoideis, fuscis, 3.5–4 mm longis, 2.8–3.2 mm latis, pubescentibus, fusco-arillatis.

Yunnan (云南): Menglian (孟连), alt. 1300–1400 m, in forests, 1993, 9, 18. Qian Yi-yong (钱义咏) 2955 (Holotype! IBSC; Isotypes! HITBC; SMAO), 3147; Lancang (澜沧) 2000, 7, 12. Qian Yi-yong (钱义咏) 3905.

多年生草本，高0.6–1.5 m；茎基稍粗。叶片披针形，长9–30 cm，宽1–6 cm，顶端尾尖，基部楔形，两面被短柔毛，无柄；叶鞘外面沿中脉和边缘被短柔毛；叶舌纸质，长1–2 mm，具缘毛。圆锥花序顶生，长25–50 cm；苞片早落，披针形，长13–15 mm；小苞片近船形，长约2 mm；花萼管漏斗形，绿褐色或褐色，具淡黄色腺点，长8–10 mm，顶端具3齿；花冠管长1.8–2.2 cm，密被短柔毛，裂片卵形，反折，黄褐色，具腺点，长8.5–9.5 mm；侧生退化雄蕊卵形，黄白色，具腺点，长8–9 mm，顶端微凹；唇瓣倒卵形，黄白色或淡黄色，具腺点，长14–18 mm，顶端2裂，基部黄色，具2紫色脉，具耳，具短距，反折，生于花丝基部稍上处；花丝长2–2.5 cm；花药长4.5–5.5 mm，两侧无翅状附属物，药隔顶端具附属物。果序上部无花，具长3.5–6.5 mm，宽1.5–3.5 mm的珠芽，下部具蒴果，椭圆形，长1–2 cm，宽1–1.3 cm，种子卵球形，褐色，长3.5–4 mm，宽2.8–3.2 mm，具短柔毛，具褐色假种皮。花期6–9月，果期9–12月。

本种与舞花姜 *Globba racemosa* Smith相近，但叶片披针形，长9–30 cm，宽1–6 cm，两面被短柔毛，圆锥花序长25–50 cm，花萼管长8–10 mm，花冠管长1.8–2.2 cm，密被短柔毛，花冠裂片长8.5–9.5 mm，侧生退化雄蕊卵形，长8–9 mm，唇瓣倒卵形，长14–18 mm，基部具耳，花丝长2–2.5 cm，花药长4.5–5.5 mm，果序上部具珠芽，易于区别。




图1 Fig. 1 孟连舞花姜 *Globba menglianensis*  
1–3. 花果序 Inflorescence; 4. 苞片 Bract; 5. 小苞片 Bracteole;  
6. 花萼在子房上纵剖 Longitudinal section of calyx; 7. 花冠裂片 Lobe of corolla;  
8. 后方一枚花冠裂片 Back lobe of corolla; 9. 唇瓣 Labellum;  
10. 侧生退化雄蕊 Staminode; 11. 花药腹面 Ventral surface of anther;  
12. 花药背面 Back surface of anther; 13. 种子 Seed.

花冠管长1.8–2.2 cm，密被短柔毛，花冠裂片长8.5–9.5 mm，侧生退化雄蕊卵形，长8–9 mm，唇瓣倒卵形，长14–18 mm，基部具耳，花丝长2–2.5 cm，花药长4.5–5.5 mm，果序上部具珠芽，易于区别。