

中国羊蹄甲属植物新分布三种

张奠湘 * 陈德昭

(中国科学院华南植物研究所, 广州 510650)

THREE SPECIES OF *BAUHINIA* L. (LEGUMINOSAE) NEW TO CHINA

Zhang Dianxiang Chen Techao

(South China Institute of Botany, Academia Sinica, Guangzhou 510650)

摘要 本文报道了三种羊蹄甲属植物在中国的新分布记录, 即产自广西的中越羊蹄甲、耐看羊蹄甲和产自云南的圆叶羊蹄甲。

关键词 中国; 羊蹄甲属; 新记录

Key words China; *Bauhinia* L.; New records

中国植物志第三十九卷(陈德昭, 1988)记载了分布于中国的羊蹄甲属植物 42 种 14 变(亚)种。张奠湘(1993)增加 1 新种 1 变种及 2 新记录种。

在整理一批采自广西、云南的标本时, 我们发现有 3 个种是以前的文献中未曾记载分布于我国, 中国植物志也未曾收录的。经查阅现有邻近地区植物志(Larsen et al., 1980; 1984), 我们确认此三种植物分别为 *Bauhinia clemensorum* Merr., *B. lakkonensis* Gagnepain, 及 *B. wallichii* Macbride. 它们在中国的分布皆为首次记录。

1 中越羊蹄甲 (新拟)

Bauhinia clemensorum Merr., J. Arn. Arb. 23: 171 (1942); Gagnepain, (Sphalm. *B. clemensorum*) Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Par. Ser. 2, 24:315 (1952); Larsen et al., Fl. Camb. Laos et Viet. 18:166 (1980). Type: Vietnam, Clemens 3621 (holo- A; iso- P).

广西平果县那禄乡。山坡阴处, 疏林中。李荫昆 P01160.

原产越南中部。

2 耐看羊蹄甲 (新拟)

Bauhinia lakkonensis Gagnepain, Not. Syst. 2:173 (1912); Fl. Gen. Indoch. 2: 140 (1913); Craib, Fl. Siam. Enum. 1(3):524 (1928); Larsen et al., Fl. Camb. Laos et Viet. 18: 181 (1980); Fl. Thail. 4(2):40 (1984). Type: Thailand, Thorel, s. n. (P). — *B. sepis* Craib,

国家自然科学基金资助课题

*现在地址: 香港 薄扶林道, 香港大学生态及分类学系

1996-03-15 收稿; 1996-07-30 修回

Kew Bull, 1927; 390; in Fl. Siam Enum. 1:528 (1928).—*B. corymbosa* auct. non. Roxb.: L. Chen. J. Arn. Arb. 20:438 (1939).

广西龙州。高锡朋55323。

原产越南北部、老挝及泰国东北部。

本种植物叶形极为优雅，故拟此中文名，一方面也取与拉丁学名谐音。

3 圆叶羊蹄甲 (新拟)

Bauhinia wallichii Macbride, Contrib. Gray Herb, n. s. 59:23 (1919); Larsen et al., Fl. Camb. Laos et Viet. 18:194 (1980). Type: India, Wallich 5774A(K)—*Phanera macrostachya* Benth., in Miq., Pl. Jungh.: 262 (1852).—*Bauhinia macrostachya* (Benth.) Baker, in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 2:281 (1878), nom. illeg. non Benth., 1840.—*B. melabophylla* Merr. J. Arn. Arb. 23:172 (1942).

云南河口。蔡克华 860.

原产印度东部，缅甸及越南北部。

致谢：拉尔森夫人 (Mrs Supee S. Larsen) 帮助鉴定圆叶羊蹄甲标本。