

广东苦苣苔科植物新资料

郑永利 夏念和

(中国科学院华南植物研究所, 广东 广州 510650)

摘要: 报道了六个广东分布新记录: 大齿马铃苣苔、匍茎短筒苣苔、短茎半蒴苣苔、圆唇苣苔和毡毛后蕊苣苔; 描述了一个新变种: 绵毛马铃苣苔。

关键词: 苦苣苔科; 新记录; 广东; 新变种

中图分类号: Q949.778.4

文献标识码: A

文章编号: 1005-3395(2002)01-0033-02

Notes on Gesneriaceae from Guangdong Province

ZHENG Yong-li XIA Nian-he

(South China Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, China)

Abstract: Six species of family Gesneriaceae are newly recorded to Guangdong Province, viz. *Oreocharis magnidens* Chun ex K. Y. Pan, *Boeica stolonifera* K. Y. Pan, *Hemiboea subacaulis* Hand.-Mazz., *Gyrochoilos chorisepalum* W. T. Wang and *Opithandra sinohenryi* (Chun) Burt. A new variety, *Oreocharis nemoralis* Chun var. *lanata* Y. L. Zheng et N. H. Xia, is described.

Key word: Gesneriaceae; New record; Guangdong Province; New variety

在编写《广东植物志》苦苣苔科过程中,发现一些广东省分布新记录种和一个新变种,现报道如下:

1. 大齿马铃苣苔

Oreocharis magnidens Chun ex K. Y. Pan, Acta Phytotax. Sin. 25(4): 276. 1987. et Fl. Reip. Pop. Sin. 69: 148. 1990; W. T. Wang et al. Flora of China 18: 254. 1998. Type: China, Guangxi, C. Wang 39651 (Holotype, IBG; Isotype, IBSC).

广东:平远,邓良 4117(IBSC)。

分布:广西。

2. 匍茎短筒苣苔

Boeica stolonifera K. Y. Pan, Acta Phytotax Sin. 26(6): 439. 1988. et Fl. Reip. Pop. Sin. 69: 256. 1990; W. T. Wang et al. Flora of China 18: 288. 1998. Type: China, Guangxi, S. H. Chen 5267 (holotype, IBSC).

广东:高州,邓良,2124(IBSC)。

分布:广西。

收稿日期: 2001-11-21 接受日期: 2002-01-23

基金项目: 中国科学院生物分类区系学科发展特别支持费资助课题

3. 短茎半蒴苣苔

Hemiboea subacaulis Hand.-Mazz., Kaiserl. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. Kl. Anz. **62**: 66. 1925 et Symb. Sin. **7**: 887. 1936; Z. Y. Li, Fl. Reip. Pop. Sin. **69**: 296. 1990; W. T. Wang et al, Flora of China **18**: 299. 1998. — *Chirita subacaulis* (Hand.-Mazz.) Burtt, Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **23**: 99. 1960. Type: China, Guangxi, Hand.-Mazz. 12758.

广东: 连州, 梁向日 5724 (IBSC); 乳源, 李耀 2020 (IBSC)。

分布: 湖南、广西和贵州。

4. 圆唇苣苔

Gyrochoilos chorisepalum W. T. Wang, Bull. Bot. Res. **1**(3): 31. 1981. et in Fl. Reip. Pop. Sin. **69**: 452. 1990; W. T. Wang et al, Flora of China **18**: 359. 1998. Type: China, Guangxi, Kwangsi Museum 381.

广东: 肇庆, 石国良 2950 (IBSC)。

分布: 广西东部。

5. 毡毛后蕊苣苔

Opithandra sinohenryi (Chun) Burtt, Not. Roy. Bot. Gard. Edinburgh **22**(4): 303. 1958; W. T. Wang, Bull. Bot. Res. **7**(2): 8. 1987 et Fl. Reip. Pop. Sin. **69**: 261. 1990; W. T. Wang et al, Flora of China **18**: 290. 1998. — *Didymocarpus sinohenryi* Chun, Sunyatsenia **6**: 290. 1946. Type: C. L. Tso 23446 (IBSC).

广东: 翁源, 刘心祈 24348 (IBSC)。

分布: 广西南部。

6. 绵毛马铃苣苔

Oreocharis nemoralis Chun var. *lanata* Y. L. Zheng et N. H. Xia, var. nov.

A var. *nemorale* foliis supra dense argenteo-lanatis, subtus dense brunneo-lanatis differt.

本变种与原变种的区别在于叶上面被银白色的绵毛, 下面被棕色的绵毛。

Guangdong (广东): Zhaoqing (肇庆), Dinghu, Jilongshan, on the rock, 1974-12-11, G. L. Shi (石国良) 11018 (IBSC); the same locality, 1978-07-06, G. L. Shi (石国良) 13547 (Holotypus, IBSC)。

致谢: 中国科学院华南植物研究所标本馆提供查阅标本方便; 承蒙吴德邻研究员审阅论文, 谨致谢忱!