

广西黄檀属(蝶形花科)一新种—靖西黄檀

刘寿养

(广西中医学院, 广西 南宁 530001)

Dalbergia jingxiensis S. Y. Liu (Papilionaceae), a New Species from Guangxi, China

LIU Shou-yang

(Guangxi Traditional Chinese Medical University, Nanning 530001, China)

关键词: 黄檀属; 靖西黄檀; 蝶形花科; 新种; 广西

Key words: *Dalbergia*; *Dalbergia jingxiensis* S. Y. Liu; Papilionaceae; New species; Guangxi

中国分类号: Q949.751.9

文献标识码: A

文章编号: 1005-3395 (2004) 06-0575-02

靖西黄檀 新种 图 1

Dalbergia jingxiensis S. Y. Liu, sp. nov. Fig. 1

Affinis *D. burmanicae* Prain., sed differt fructibus, foliis et foliolis multo parvis, foliis 4-11 cm longis, foliolis 1-3.5 cm longis, 8-15 mm latis, paniculis brevioris 2-5 cm longis, 1-3.5 cm latis, axillaribus vel terminalibus, calycibus longioribus 5-6 mm longis, vexillis apice obtusis vel emarginatis non deflexis.

Frutex 2-3 m altus; ramus divaricatus. Ramulus griseo-nigrescens, flavo-brunneo-pubescentes, sensim glabrescens, lenticellatus, lenticellis ellipticis vel suborbiculatis. Folia imparipinnata 4-11 cm longa, 5-15-foliolata; petioli 8-12 mm longi cum rachibus puberulis; foliola oblonga, 1-3.5 cm longa, 8-15 mm lata, apice rotundata, obtusa, emarginata vel mucronata, basi late cuneata vel subrotundata, supra viridia, parce appresse griseo-albido-pubescentia, nervi minute impressi, subtus viridula, nervi elevati, parce appresse fusco-pubescentia; petioluli circ. 2 mm longi, dense brunneo-pubescentes; foliola terminales obovato-oblonga. Panicula pauci-ramosa axillaris vel terminalis, cum pedunculo 2-5 cm longa, 1-3.5 cm lata, dense fuligineo-pubescentes; floribus parvis satis confertis; pedicellis 1-2 mm longis; calycibus 5-6 mm longis, extus dense adpresso fuligineo-pubescentibus; tubis

campanulatis 4-5 mm longis, dentibus 5, late triangularibus vel triangulari-oblongis, apice acuminatis, rotundatis vel obtusis, intus dense pubescentibus, uno inferioribus longiore circ. 1.5 mm longis; corolla alba, petalis subaequilongis, omnino basi unguiculatis, vexillis aliquanto subcucullatis, obovato-orbiculatis vel suborbiculatis, 3-4 mm longis, 2-2.5 mm latis, paulo inaequilateralibus, apice obtusis vel emarginatis; alis oblongis, circ. 4 mm longis, basi auriculatis; carinis obovato-oblongis circ. 4 mm longis, basi breviscule auriculatis; staminibus 9, monadelphis 4-5 mm longis, forsitan 1-2 staminibus reductis ac petaloideis; ovaria oblonga glabra 1.5-2 mm longa, basi stipitata, 2-3-ovulata; styli circ. 2 mm longi; stigma minuta. Fructus ingnotus. Florescentia Jan.-Feb.

广西 (Guangxi): 靖西县 (Jingxi xian), 湖润镇 (Hurun zhen), 新兴村, 丘陵, 有石灰岩石裸露, 灌丛中 (on rocky hill in thicket), 少见。2000-01-17 刘寿养 (Liu Shou-yang) 002968 (holotype, here designated, IBSC).

灌木, 高 2-3 m, 分枝开展; 小枝灰黑色, 密被黄褐色短柔毛, 后毛渐脱落, 具椭圆形或近圆形皮孔。羽状复叶长 4-11 cm; 叶柄长 8-12 mm, 连同叶轴被微柔毛; 小叶 5-15 枚, 长圆形, 长 1-3.5 cm, 宽 8-15 mm, 先端圆、钝或微凹, 有小尖凸, 基部宽楔形或

近圆形，边缘背卷，上面绿色，疏被灰白色伏贴柔毛，叶脉微凹，下面淡绿色，疏被淡褐色伏贴柔毛，叶脉凸起；小叶柄长约 2 mm，密被褐色短毛；顶生小叶倒卵状长圆形。圆锥花序顶生或腋生，分枝少，连总花梗长 2–5 cm，宽 1–3.5 cm，密被污棕色短柔毛；花小，密集，花梗长 1–2 mm；花萼长 5–6 mm，外面密被黑棕色伏贴短硬毛；萼管钟状，长约 4 mm，萼齿 5，三角形或三角状长圆形，先端渐尖、圆或钝，内面密被短柔毛，长约 1 mm，下方 1 枚较长，长约 1.5 mm。花冠白色，花瓣近等长，基部具长 2–3 mm 的柄；旗瓣倒卵状圆形或近圆形，有时浅勺状，长 3–4 mm，宽 2–2.5 mm，通常两侧稍不对称，先端圆钝

或凹缺；翼瓣长圆形，长约 4 mm，内侧具耳；龙骨瓣倒卵状长圆形，长约 4 mm，内侧具耳；雄蕊 9，单体，长 4–5 mm，花丝长短相间，偶见其中 1–2 枚退化而扩大呈花瓣状；子房长圆形，长 1.5–2 mm 无毛，具长约 2 mm 的柄，有 2–3 胚珠；花柱细，长约 2 mm，柱头细小。果实未见。花期 1 月至 2 月。

本种近似缅甸黄檀 *Dalbergia burmanica* Prain., 但为灌木，羽状复叶及小叶均远小，复叶长 4–11 cm，小叶纸质，长 1–3.5 cm，宽 8–15 mm，圆锥花序较短，长 2–5 cm，宽 1–3.5 cm，腋生或顶生；花萼较长，长 5–6 mm，旗瓣先端钝或凹缺，不反折，易于区别。



图 1 Fig. 1 靖西黄檀 *Dalbergia jingxiensis* S. Y. Liu

1. 花枝 Flowering branch; 2. 花 Flower; 3. 旗瓣 Standard; 4. 翼瓣 Wing; 5. 龙骨瓣 Carene; 6. 雄蕊 Stamen; 7. 子房 Ovary